

V š e m č l e n ů m a p ř í z n i v c ů m
S e v e r o č e s k é p o b o č k y Č S B S
p ř í j e m n é v á n o č n í s v á t k y a h o d n ě z d r a v í i d o b r é h o p o č a s í
n a f l o r i s t i c k o u p r á c í v n o v ě m r o c e 1973 p ř e j e

v ý b o r.

Zpravodaj č.2 - 1972 v počtu 70 výtisků určen jen pro členy.
Karel Kubát, prom. biolog, t.č. předseda Pobočky, Litoměřice-muzeum.
Olga Roubínková, t.č. jednatelka, Leningradská 144, Novosedlice,
okr. Teplice.

Z P R A V O D A J Severočeské pobočky Čs.botan.spol.
č. 2 - prosinec 1972

P o z v á n í

na výroční členskou schůzi Severočeské pobočky Čs. botanické společnosti, která se koná v sobotu 20.ledna 1973 v 15,00hod. v budově Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, ul. České mládeže 8 v místnosti, která bude u vchodu blíže označena.

Program: 1/ Zahájení.

2/ Volba volební komise.

3/ Zpráva o činnosti za uplynulé období.

4/ Zpráva pokladní a revizní.

5/ Volba nového výboru Severočeské pobočky ČSBS.

6/ Plán činnosti na rok 1973.

Od 15,45 hod. přednáška dr. Vojena Ložka, Dr.Sc.:

V ý v o j k r a j i n y a s t e p n í
o t á z k a v Č e c h á c h.

V diskusi je možno vystoupit i s kratšími příspěvky z nebotanických oborů.

H o s t é j s o u v í t á n í !

o o o o
o o o
o o
o

Nejdůležitější synonyma rodových jmen vyšších rostlin

Současný trend v taxonomii směřuje stále zřetelněji k rozdělování velmi širokých linnéovských rodů na rody přirozenější, užší. Taxonomické změny jsou vyjádřeny častým tvořením nových jmen rostlin nebo upozorňováním na jména, v posledních desetiletích nepoužívaná. Protože nové vydání určovacího klíče květeny ČSSR není možno v nejbližší době očekávat, předkládám přehled nejdůležitějších rodových jmen, používaných v novější literatuře, která nejsou uvedena ani jako synonyma ve 2. vydání Dostálova Klíče (Dostál 1958). Má sloužit k nejzákladnější orientaci floristům, zabývajícím se severočeskou květenou, kteří nemají možnost změny v nomenklatuře pravidelně sledovat. Seznam má sloužit pouze jako "slovníček". Není tedy u jednotlivých rodových jmen uvedeno jejich přesné vymezení, autorské zkratky atd. U jmen, která nejsou pouhými synonymy (uvažováno pro severočeskou květenou!), je v závorce obvykle uveden příklad.

Použité zkratky: agg. = kolektivní druh;

p. p. = zčásti (část rodu)

Acinos = Calamintha p. p. (C. acinos)
 Acosta = Centaurea p. p. (C. stoebe, rhenana)
 Acrocentron = Centaurea p. p. (C. scabiosa)
 Alexitoxicon = Cynanchum
 Anisantha = Bromus p. p. (B. tectorum)
 Avenochloa = Helictotrichon p. p. (H. pratensis, pubescens)
 Barkhausia = Crepis p. p. (C. foetida, setosa)
 Chamaesyce = Euphorbia p. p. (E. supina)
 Chamerion = Chamaenerion
 Cineraria = Senecio p. p. (S. rivularis)
 Clinopodium = Calamintha p. p. (C. clinopodium)
 Colymbada = Centaurea p. p. (C. scabiosa)
 Cruciata = Galium p. p. (C. laevipes = G. cruciata; C. glabra = G. verum)
 Dactylorhiza = Dactylorhiza = Orchis p. p. (O. maculata agg., O. majalis agg., sambucina)
 Fallopia = Bilderdykia
 Gentianopsis = Gentianella p. p. (G. ciliata)

Gifola = Filago p. p. (F. germanica)
 Groenlandia = Potamogeton p. p. (P. densus)
 Gymnocarpium = Phegopteris p. p. (P. dryopteris, robertiana)
 Hippochaete = Equisetum p. p. (E. variegatum, ramosissimum, hyemale)
 Jovibarba = Sempervivum p. p. (S. soboliferum)
 Ladanum = Galeopsis p. p. (G. angustifolia, ochroleuca, ladanum)
 Lamiastrum = Lamium p. p. (L. galeobdolon agg.)
 Leucanthemum = Chrysanthemum p. p. (C. leucanthemum agg.)
 Lycopodiella = Lepidotis
 Myosoton = Malachium
 Orthilia = Ramischia
 Otites = Silene p. p. (S. otites)
 Petrorhagia = Tunica
 Phelipanche = Orobanche p. p.
 Pilosella = Hieracium p. p. (H. pilosella)
 Pistolochia = Corydalis
 Pleconax = Silene p. p. (S. conica)
 Pseudolysimachion = Veronica p. p. (V. spicata, longifolia)
 Pseudorchis = Leucorchis
 Psyllium = Plantago p. p. (P. indica)
 Pyrethrum = Chrysanthemum p. p. (C. corymbosum)
 Rhodax = Helianthemum p. p. (H. canum)
 Rhodococcum = Vaccinium p. p. (V. vitis-idaea)
 Scirpoides = Holoschoenus
 Swida = Cornus p. p. (S. sanguinea)
 Tinaria = Pleuropterus, Bilderdykia
 Tithymalus = Euphorbia (autochtonní druhy)
 Trommsdorffia = Achyrophorus
 Typhoides = Baldingera
 Virga = Dipsacella
 Xanthoxalis = Oxalis p. p. (žluté kvetoucí)
 Zerna = Bromus p. p. (B. ramosus, benekenii, erectus, inermis)

Literatura: Dostál J. (1958): Klíč k úplné květeně ČSR.- Praha.- Ehrendorfer F. (1967): Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas.- Graz.- Rothmaler W. (1972): Exkursionsflora. Gefäßpflanzen.- Berlin. (Články v časopisech neuvedeny)

K. Kubát